

# FRONTMAX® COLEIRA

Uso Veterinário

Coleira antiparasitária eficaz contra mosquitos transmissores da leishmaniose, pulgas e carrapatos em cães.

## FÓRMULA:

Cada 100g contém:

Fipronil.....	4 g
Piriproxifeno.....	4 g
Permetrina.....	8,5 g
Excipiente q.s.p.....	100 g

## INDICAÇÕES:

FRONTMAX COLEIRA é indicado para cães e possui eficácia carrapaticida contra o carrapato *Rhipicephalus sanguineus* e eficácia pulicida contra a pulga *Ctenocephalides felis felis* por até 8 meses, após colocada no pescoço do animal. O produto também possui ação inseticida contra o mosquito flebotomíneo transmissor da leishmaniose (*Lutzomyia longipalpis*).

## MODO DE USAR:

Retire a coleira de sua embalagem. Desenrole-a e retire todos os conectores plásticos da face interna antes de colocá-la no animal. Coloque a coleira no pescoço do animal, de forma justa, sem apertar deixando um espaço de dois dedos entre a coleira e o pescoço do animal e afivele.

Corte o excedente da ponta da coleira caso ultrapasse 2 cm.

Atenção: checar periodicamente a coleira e ajustar caso necessário, principalmente se a coleira for colocada em filhotes que estão em fase de crescimento. FRONTMAX COLEIRA deve ser utilizada continuamente devendo ser retirada após 8 meses ou quando apresentar sinais de retorno das infestações. FRONTMAX COLEIRA é resistente a água e permanece eficaz mesmo se o animal for banhado com a coleira.

**RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES:**

- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não utilizar a embalagem vazia.
- Descartar a embalagem e restos do produto de forma segura evitando a contaminação do meio ambiente.
- Produto tóxico para peixes e abelhas.
- Não guardar ou aplicar produto junto com alimentos, medicamentos, produtos de higiene, bebidas e utensílios domésticos.
- Não fumar, beber e se alimentar durante o manuseio e aplicação do produto.
- Utilizar luvas protetoras para administrar o produto.
- Evitar o contato do produto com pele, olhos e boca.
- Após a aplicação da coleira, remover as luvas e lavar bem as mãos.
- No caso de contato com pele, lavar o local imediatamente com água e sabão em abundância.
- No caso de contato direto com os olhos, lavar imediatamente com água corrente.
- Pessoas com sensibilidade conhecida aos ingredientes da coleira devem evitar o contato com o produto

**CONTRAINDICAÇÕES:**

- NÃO USAR A COLEIRA EM GATOS.
- Não usar a coleira em cães com menos de 10 meses de idade.
- Não usar a coleira em fêmeas prenhes e lactantes.

**REAÇÕES ADVERSAS:**

Cães com histórico de hipersensibilidade poderão apresentar reações alérgicas cutâneas. Nestes casos, retirar a coleira e banhar o animal com água e sabão para remoção do produto e no caso da persistência dos sintomas, procurar o Médico-Veterinário, levando consigo a embalagem do produto.

**ATENÇÃO:**

Este medicamento não é para uso humano.

**GRUPO QUÍMICO DOS COMPONENTES ATIVOS:**

Fenilpirazol (fipronil), piridinas (piriproxifeno) e piretróide sintético (permetrina).

**CUIDADO VENENO:**

Em caso de intoxicação humana, procurar imediatamente assistência médica, levando consigo a embalagem do produto.

**INDÚSTRIA BRASILEIRA****CONSERVAÇÃO:**

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local arejado, ao abrigo da luz e calor, em temperatura ambiente variando de 15 a 30°C e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Uma vez aberta a embalagem, a coleira deverá ser colocada no animal.

**FABRICANTE E PROPRIETÁRIO: CLARION BIOCÊNCIAS LTDA.**

R. 4, S/N, Qd. 07, LT. 47 -55 – Polo Empresarial Goiás. Aparecida/GO. CNPJ/MF 03.244.722/0004-22.

E-MAIL: adm@clarionbio.com.br / www.clarionbio.com.br / www.vetoquinol.com.br

TELEFONE: (62) 3611-1600

**Resp. Técnico:**

Gladstone Santos de Souza, PhD.

CRMV/GO n° 1.863.

Licenciado pelo MAPA desde 08/11/2018.

Registrado sob o n° GO 000005- 1 .000021.