

Uso Veterinário

KAOTOP^{*} SC

Inseticida de tripla ação para eliminação de baratas, formigas e moscas em ambientes externos.

Antes de usar o produto, leia com atenção as precauções, recomendações, indicações e modo de usar impressos nesta bula.

FÓRMULA:

Cada 1.000mL contém:

Deltametrina	25g
Fipronil	5g
Piriproxifeno	15g
Veículo q.s.p.	1.000mL

INDICAÇÕES: KAOTOP SC possui tripla ação inseticida para eliminação de baratas, formigas e moscas domésticas em ambientes externos.

MODO DE USAR: Agitar o produto antes de usar e diluir em água conforme tabela abaixo:

Quantidade de água	Insetos voadores (moscas)	Insetos rasteiros (baratas e formigas)
1 litro	6 mL	8 mL
10 litros	60 mL	80 mL
20 litros	120 mL	160 mL

Utilizar 1 litro de calda para cada 20m² de superfície. Aplicar por meio de pulverizador, em superfícies passíveis de repouso, trânsito e esconderijo dos insetos.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES:

- **MANTER O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- Não aplicar o produto em locais das instalações rurais passíveis de contato com animais domésticos e de produção;
- Não aplicar o produto em substratos que entrem em contato direto com os animais de produção, tais como: cama de frango e palha de arroz;
- Não aplicar o produto em recipientes destinados a alimentação e hidratação dos animais de produção, tais como: cochos, comedouros e bebedouros;
- Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto;
- Não utilize equipamentos com vazamento;
- Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca;
- Durante o manuseio e aplicação do produto, utilizar equipamentos de proteção individual, tais como: máscaras cobrindo o nariz e boca, óculos de proteção, luvas de

borracha, macacão com mangas compridas, avental impermeável e botas;

- Não contamine coleções de água de qualquer natureza;
- Descartar as embalagens vazias e restos de produto, bem como limpar os equipamentos ou recipientes usados de forma segura, evitando a contaminação do meio ambiente;
- Não aplicar KAOTOP SC contra o vento;
- Não guardar ou aplicar KAOTOP SC junto com alimentos, medicamentos, produtos de higiene, bebidas e utensílios domésticos;
- Produto tóxico para peixes;
- Utilizar o produto no máximo 24 horas após sua diluição em água;
- Após a utilização do produto, remover as roupas protetoras e tomar banho.

Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito. Procurar Serviço de Saúde, levando a embalagem do produto. Não dê nada, via oral, a uma pessoa inconsciente. **Em caso de contato direto com o produto**, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. **Em caso de contato com os olhos**, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Persistindo a irritação, procurar Serviço de Saúde. **Se inalado em excesso**, remover a pessoa para local ventilado.

GRUPO QUÍMICO DOS COMPONENTES ATIVOS:

Piretróide (deltametrina), fenilpirazol (fipronil) e piridina (piriproxifeno).

CONSERVAÇÃO:

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local arejado, ao abrigo da luz e calor e em temperatura ambiente variando de 15 a 30°C. Após aberto o frasco, o produto poderá ser utilizado por até 4 meses.

FABRICANTE E PROPRIETÁRIO:

CLARION BIOCÊNCIAS LTDA.

R.4, S/N, Qd. 07, Lt. 47-55, Polo Empresarial Goiás.

Aparecida de Goiânia/GO.

CNPJ/MF 03.244.722/0004-22.

adm@clarionbio.com.br

www.clarionbio.com.br

TELEFONE: (62) 3611-1600

Resp. Técnico:

Gladstone Santos de Souza, PhD - CRMV/GO nº. 1863.

Licenciado pelo MAPA desde 13/12/2018.

Registrado sob o nº GO 000005-1.000022.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO



CUIDADO! PERIGOSO!

INDÚSTRIA BRASILEIRA

