

# Floxin® Oral

## USO VETERINÁRIO

### ANTIMICROBIANO DE LARGO ESPECTRO

#### FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Enrofloxacino ..... 20 g

Veículo q.s.p. .... 100 mL

**Floxin® Oral** apresenta como princípio ativo o Enrofloxacino que é um agente antimicrobiano do grupo das fluoroquinolonas com atividade de amplo espectro, especialmente contra bactérias Gram-negativas.

#### INDICAÇÕES:

**Floxin® Oral** é indicado para aves, no tratamento de diversas infecções tais como:

#### AVES:

Tratamento de infecções respiratórias e gastrintestinais causadas por *Salmonella typhimurium*, *Staphylococcus aureus* e *Escherichia coli*.

#### POSOLOGIA E MODO DE USAR:

O produto deve ser administrado por via oral, ou adicionado à água de bebida dos animais, nas seguintes doses:

#### AVES:

Administrar 10 mg de enrofloxacino / kg de peso corporal / dia.

Para o produto nas apresentações de 20 mL, 50 mL e 100 mL é recomendado:

Diluir na água de bebida, na proporção de 5 mL para 20 L de água o que fornece enrofloxacino na proporção de 50 ppm. A solução deve ser administrada por 5 dias consecutivos.

Para o produto nas apresentações de 500 mL e 1000 mL é recomendado:

Diluir na água de bebida, na proporção de 500 mL para 2.000 L de água o que fornece enrofloxacino na proporção de 50 ppm. A solução deve ser administrada por 5 dias consecutivos.

#### PRECAUÇÕES:

A solução não consumida em 24 horas deverá ser desprezada e uma nova solução deverá ser preparada.

Durante o tratamento, não fornecer outra fonte de água de bebida.

#### OBSERVAÇÕES:

Doses e esquemas de tratamento poderão ser alterados a critério do Médico Veterinário.

Recomenda-se não interromper o tratamento antes de decorridas 48 horas do desaparecimento dos sintomas da infecção.

#### CONTRA-INDICAÇÕES:

Devido a possíveis efeitos sobre as cartilagens das articulações em animais em desenvolvimento, recomenda-se cautela na administração do produto a animais em crescimento.

#### INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Soluções que contém íons, ferro, zinco, magnésio, alumínio e cálcio podem diminuir a absorção do princípio ativo.

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA**

**FRANGO:**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 13 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**OVOS: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER ADMINISTRADO EM AVES PRODUTORAS DE OVOS PARA O CONSUMO HUMANO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

**CONSERVAR EM LOCAL FRESCO E SECO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS  
VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO  
LICENCIADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA  
SOB Nº 8.776 EM 20/01/04.  
RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
DR. PAULO ROBERTO ANDREOLI - CRMV/SP Nº 8147**

**APRESENTAÇÃO:**

Frascos plásticos contendo 20 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL e 1 L.

**PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:**

**Vétoquinol Saúde Animal Ltda**  
Rodovia Fernão Dias, km 56  
Mairiporã - SP - Telefone: (11) 3568-1111  
CNPJ: 60.528.742/0001-16  
Indústria Brasileira

