

<b>Vétoquinol</b>	<b>Nom du produit : FORCYL BR</b>	
<b>Crée par : V.Massard</b>	<b>Référence article : 0615 A</b>	
<b>le :</b>	<b>Dimensions : 160x120 mm</b>	
<b>Visa :</b>	<b>1 couleur</b>	<b>rev A</b>
	281 U	



**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:**

**BOVINOS:**  
**ABATE:** o abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado em 5 dias após a última aplicação.

**LEITE:** o leite dos animais tratados com este produto não deve ser destinado ao consumo humano até 2 dias após a última aplicação deste produto.

**SUÍNOS:**  
**ABATE:** o abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado em 9 dias após a última aplicação.

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

**CONSERVAR EM LOCAL FRESCO E SECO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.789 em 21/02/2014  
 Responsável Técnico: Paulo Roberto Andreoli – CRMV-SP nº 8147

**PRAZO DE VALIDADE:** 02 (dois) anos após a data de fabricação.

**APRESENTAÇÃO:** Frascos de vidro âmbar contendo 50, 100 e 250 mL.

**PROPRIETÁRIO E IMPORTADOR**  
**Vétoquinol Saúde Animal Ltda.**

Rodovia Fernão Dias, Km 56  
 CEP: 07600-000 – Mairiporã – SP  
 Tel.: 11 3568-1111 - CPNJ: 60.528.742/0001-16  
 e-mail: faleconosco@vetoquinol.com.

**FABRICANTE:**

**Vétoquinol S.A.,** Maghny Vernois, BP 189, 70204 – Lure - França  
**PRODUTO IMPORTADO**



0615 A



**FORCYL**

**SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA BOVINOS E SUÍNOS**

**USO VETERINÁRIO**

**COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:**

Cada 100 mL contém:  
 Marbofloxacina .....16,0 g  
 Álcool Benzílico .....1,50 g  
 Veículo q.s.p .....100,00 mL

**INDICAÇÕES:**

**Bovinos:**  
**Em bovinos:** tratamento terapêutico de infecções respiratórias provocadas por cepas sensíveis de *Pasteurella multocida* e *Mannheimia haemolytica*.  
**Em vacas em lactação:** tratamento da mastite aguda provocada por cepas sensíveis de *Escherichia coli*.  
**Suínos:**  
**Em leitões:** tratamento de infecções intestinais causada por cepas sensíveis de *Escherichia coli*.  
**Em suínos de engorda:** tratamento de infecções do trato respiratório provocadas por cepas sensíveis de *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* e *Haemophilus parasuis*.  
**Em suínos:** tratamento de infecções do trato urinário causada por cepas sensíveis de *Escherichia coli*.  
**Em pós-partos de porcas:** tratamento da síndrome metrite-mastite-agalaxia causada por cepas sensíveis de *Escherichia coli*.

**VIA DE ADMINISTRAÇÃO, MODO DE USAR E DOSAGEM:**

**Bovinos:**  
 - Tratamento terapêutico das infecções respiratórias:  
 Aplicar o produto por via intramuscular, em dose única, na dosagem de 10 mg/kg de peso vivo, equivalente a 10 mL/160 Kg de peso vivo.  
 - Tratamento da mastite aguda causada por cepas sensíveis de *Escherichia coli*:  
 Aplicar o produto por via intramuscular ou intravenosa, em dose única, na dosagem de 10 mg/kg de peso vivo, equivalente a 10 mL/160 Kg de

peso vivo.  
 Se o volume a ser injetado por via intramuscular for superior a 20 mL, deve ser dividido em dois ou mais pontos por injeção.

**Suínos:**  
 Aplicar o produto por via intramuscular, na região do pescoço, em dose única, na dosagem de 8 mg /kg de peso vivo, equivalente a 1 mL/20 Kg de peso vivo.

**ADVERTÊNCIAS:**  
 Advertências especiais para a cada espécie alvo: nenhuma.

**CONTRAINDICAÇÕES:**  
 Não utilizar em animais com conhecida hipersensibilidade a marbofloxacina ou a quaisquer excipientes.  
 Não administrar em casos onde o agente patogênico é resistente a outras fluorquinolonas (resistência cruzada).

**Suínos:** não usar como profilaxia ou metafilaxia para prevenir diarreia no desmame de leitões.

**PRECAUÇÕES:**  
**Precauções especiais de utilização no animal:**  
 - Devem ser tomadas em consideração as políticas antimicrobianas oficiais e locais quando da administração deste medicamento veterinário.  
 - É prudente reservar as fluorquinolonas para o tratamento de situações clínicas que tenham tido, ou que se espere que venham a ter fraca resposta, a outras classes de antibióticos. Sempre que possível, a administração de fluorquinolonas deve ser baseada em testes de sensibilidade.  
 - A administração deste medicamento veterinário, fora das indicações propostas nesta bula, pode aumentar a prevalência da resistência bacteriana às fluorquinolonas e diminuir a eficácia do tratamento com outras quinolonas devido a potencial resistência cruzada.

**Precauções especiais a serem adotadas pela pessoa que administra o medicamento veterinário:**  
 - Pessoas com conhecida hipersensibilidade as fluorquinolonas, devem evitar qualquer contato com o medicamento veterinário.  
 - Se o medicamento veterinário entrar em contato com a pele ou olhos, lavar abundantemente com água.  
 - Administrar com precaução, de modo a evitar a auto-injeção acidental. Em caso de auto-injeção acidental, procurar assistência médica e mostrar o rótulo ao médico. A auto-injeção acidental pode causar uma ligeira irritação.

**Utilização em caso de gestação e lactação:**  
 - Estudos realizados em animais de laboratório (ratos e coelhos) não produziram nenhuma evidência de efeitos teratogênicos, embriotóxicos ou maternotóxicos associados à administração da marbofloxacina.  
 - **Bovinos:** a segurança do medicamento veterinário na dose de 10 mg/kg não foi determinada em vacas gestantes ou em bezerras lactantes quando usado em vacas.  
 - **Suínos:** a segurança do medicamento veterinário na dose de 8 mg/kg não foi determinada em porcas gestantes ou em leitões lactantes quando usado em marrãs.  
 - O medicamento veterinário deve ser administrado de acordo com a avaliação benefício/risco realizada pelo médico veterinário responsável.

**EFEITOS COLATERAIS:**  
**Bovinos:**  
 A administração em bovinos, por via intramuscular, pode provocar raras reações locais e transitórias, tais como dor e tumefação no local de aplicação que podem persistir por até 7 dias após a injeção. As fluorquinolonas são conhecidas por induzir artropatias, em bovinos, tais lesões foram observadas após um tratamento de três dias com a solução de marbofloxacina a 16%. Estas lesões não induziram sinais clínicos e devem ser reversíveis, particularmente se forem observadas após uma única aplicação. Nenhum outro efeito colateral foi observado em bovinos.

**Suínos:**  
 Estudos realizados em porcos e leitões demonstrou que o produto pode causar reações locais, como dor e inchaço, por um período de até 36 dias. Nenhum outro sinal foi observado em leitões ou porcos. A administração por via intramuscular pode provocar lesões na cartilagem das articulações que pode levar a dificuldade de movimentos, porém essas lesões só foram observadas em animais que foram tratados com três vezes a dose recomendada e por três dias consecutivos.

**INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS E ANTÍDOTOS:**  
 Desconhecidas.  
**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:**  
 Manter em local fresco e sob temperatura de até 30°C.  
 Prazo de validade após abertura da embalagem primária: 28 dias.