

Polijet® HD

USO VETERINÁRIO
INJETÁVEL

FÓRMULA:

Cada frasco de 500 mL contém:

Dextrose anidra.....	25,000 g
Cloreto de Sódio.....	2,485 g
Cloreto de Potássio.....	0,185 g
Cloreto de Cálcio Dihidratado.....	0,145 g
Cloreto de Magnésio Hexahidratado.....	0,100 g
Lactato de Sódio.....	3,370 g
Veículo q.s.p.....	500,000 mL

Cada frasco-ampola de 5 mL contém:

Vitamina B12.....	2,000 mg
Veículo q.s.p.....	5,000 mL

INDICAÇÕES:

Indicado para bovinos e equinos doentes e com anorexia, para a correção do desequilíbrio hidroeletrólítico (sódio, potássio, cloreto, magnésio e cálcio) e desequilíbrio energético (glicose, vitamina B12 e lactato de sódio).

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, MODO DE USO E DOSAGEM:

Adicionar o conteúdo do frasco-ampola (Vitamina B12) dentro do frasco de 500 mL. Agitar o frasco levemente para a solução ficar com uma coloração homogênea. Administrar por via intravenosa na posologia de 15 a 20 mL/Kg/h.

Duração do tratamento:

O tratamento deverá durar o tempo necessário para que a causa da desidratação seja corrigida e o animal volte a ingerir água e alimentos em quantidade suficiente para manter-se hidratado e ou a critério do Médico Veterinário.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS: ABATE – CARÊNCIA ZERO; LEITE: CARÊNCIA ZERO.

EQUINOS: ABATE – CARÊNCIA ZERO.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não administrar o produto por via subcutânea, intramuscular ou oral.

Não administrar o produto em espécies animais que não estão contemplados na bula.

Após a preparação, o produto deverá ser administrado em até 6 horas, não administrá-lo após esse período.

PRECAUÇÕES:

- Os animais deverão ser contidos em troncos específicos para a espécie.
- Limpar o local de aplicação com álcool iodado e, se possível, realizar a tricotomia.
- Respeitar a via de aplicação especificada em bula.

EFEITOS COLATERAIS:

Os estudos clínicos realizados em bovinos e equinos demonstraram que o produto não apresenta efeitos colaterais quando administrado de acordo com a bula.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

O produto pode ser administrado concomitante com outras drogas.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

Manter em local fresco e conservar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).

APRESENTAÇÕES:

Frasco plástico de 500 mL e frasco-ampola de 5 mL.

PRAZO DE VALIDADE:

2 (dois) anos após a data de fabricação.

**CONSERVAR O PRODUTO À TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 30°C), EM LOCAL FRESCO E SECO E AO ABRIGO DA LUZ SOLAR.
MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS
E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO
MÉDICO VETERINÁRIO.**

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob o nº 3 em 07/03/2017.

Responsável Técnico: Paulo Roberto Andreoli – CRMV-SP nº 8147.

Proprietário e Fabricante:
VETOQUINOL SAÚDE ANIMAL LTDA.
Rodovia Fernão Dias, Km 56
CEP: 07600-000 – Mairiporã – SP
CPNJ: 60.528.742/0001-16
Tel.: 11 3568-1111
E-mail: faleconosco@vetoquinol.com

