FRENTE VERSO



Uso Veterinário

## FÓRMULA:

Cada 100g contém:	
Imidacloprid	2g
Excipiente q.s.p	. 100g

## INDICAÇÕES:

Para o controle de infestações por mosca doméstica em instalações rurais como: granjas de aves e suínos, haras, currais e estábulos.

### MODO DE USAR E DOSAGENS:

- Espalhar os grânulos de *Acima* no piso dos locais com maior incidência de moscas na proporção de 2g para cada m², ou seja, 25g para cada 12,5m² de área.
- Nos locais onde não é possível espalhar os grânulos do produto no piso, recomenda-se colocar o produto em recipientes plásticos ou de papel, com aproximadamente 3g em cada um, o que tratará em média uma área de 1,5m², distribuindo-os em locais estratégicos junto a prateleiras, bancadas, rodapés, janelas ou em outros locais frequentados pela mosca doméstica, sempre fora do alcance de animais domésticos e criancas.
- Periodicamente deve-se remover as moscas mortas do recipiente com Acima para que outras moscas tenham livre acesso ao produto.
- Acima deve ser renovado quando estiver coberto de pó ou quando for percebida diminuição de sua efetividade.
- Acima deve ser espalhado de forma a evitar-se o contato manual com o produto.

# CONTRAINDICAÇÕES:

Não apresenta contraindicações, desde que sejam rigorosamente seguidas as recomendações. Porém não deve ser usado em conjunto com iscas à base de produtos dos grupos químicos dos organofosforados, piretróides e carbamatos.

## ADVERTÊNCIAS:

- Não guardar ou aplicar Acima junto com alimentos, medicamentos, produtos de higiene, bebidas e utensílios domésticos.
- Descartar as embalagens vazias de forma segura e evitando a contaminação do meio ambiente.
- Evitar contato com a pele e olhos durante o uso do produto.
- Produto tóxico para abelhas e peixes.
- Utilizar luvas durante a aplicação do produto e após o

seu uso, tomar banho com bastante água e sabão.

- Não comer, beber ou fumar durante a aplicação do produto.
- Em caso de intoxicação humana procurar imediatamente assistência médica, levando consigo a embalagem do produto.
- Conservar o produto em sua embalagem original, em local arejado, ao abrigo da luz e calor, em temperatura ambiente variando de 15 a 30°C e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

### **ACIDENTES EM HUMANOS:**

Acidente tópico: retirar as roupas atingidas e lavar a pele com bastante água corrente e sabão.

Acidente ocular: lavar os olhos com bastante água corrente por pelo menos 15 minutos.

**Ingestão acidental:** provocar vômito se a pessoa estiver consciente e procurar imediatamente um médico levando consigo a embalagem do produto.

# GRUPO QUÍMICO DO COMPONENTE ATIVO:

Neonicotinoide.

# **APRESENTAÇÕES:**

Sachê contendo 25g e frasco plástico contendo 1kg.

# PROPRIETÁRIO: CLARION BIOCIÊNCIAS LTDA.

R.4, S/N, Qd. 07, Lt. 47-55, Polo Empresarial Goiás. Aparecida de Goiânia/GO

CNPJ/MF 03.244.722/0004-22

adm@clarionbio.com.br | www.clarionbio.com.br

TELEFONE: (62) 3611-1600 FABRICANTE:

PHARMALOGIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Av. Lucas Nogueira Garcez, 765, Jacareí/SP CNPJ/MF 05.451.258/0001-28.

**Resp. Técnico:** Gladstone Santos de Souza, PhD. CRMV/GO nº 1.863.

Licenciado no Min. da Agricultura sob nº 8 380 em 05/11/2002







INDÚSTRIA BRASILEIRA

