

Uso Veterinário

Brinco Mosquicida

à base de diazinon

FÓRMULA:

Cada brinco com 15g contém:

Diazinon 6,0g

Excipiente q.s.p. 15,0g

ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA:
BOVINOS:

ABATE: CARÊNCIA ZERO. RETIRAR OS BRINCOS 24 HORAS ANTES DO ABATE.

LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

INDICAÇÕES: BRINCO MOSQUICIDA À BASE DE DIAZINON é um brinco inseticida, pronto para uso, indicado para o controle da mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*) em bovinos de corte.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: USO EXTERNO.

MODO DE USAR E DOSAGENS: O brinco deve ser aplicado através de um aplicador, específico para brincos em animais, na região mediana da face externa da orelha, evitando a perfuração dos vasos sanguíneos na cartilagem auricular. Aplicar um brinco por animal.

Importante: Para evitar aparecimento de resistência, todos os animais do mesmo lote devem ser tratados. Os brincos devem ser retirados 180 dias após a aplicação, cortando o pino fixador com uma tesoura ou alicate. Nesse momento, havendo ainda condições propícias a novas infestações, novos brincos deverão ser colocados.

ACIDENTES EM HUMANOS:

Acidente tóxico: Retirar as roupas atingidas e lavar a pele com bastante água corrente e sabão.

Acidente ocular: Lavar os olhos com bastante água corrente pelo menos durante 15 minutos.

Ingestão acidental: Chamar um médico imediatamente. Caso a pessoa esteja consciente, dar de beber um ou dois copos de água e induzir o vômito tocando o fundo da garganta com o dedo. Não induza o vômito caso a pessoa esteja inconsciente ou tendo convulsões.

ANTÍDOTO: Sulfato de atropina e reativadores da colinesterase (PAM ou Contrathion). Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não aplicar em bezerros com menos de três meses de idade, pois o pino aplicador pode causar danos teciduais às orelhas.

RECOMENDAÇÕES:

- **O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local arejado, ao abrigo da luz e calor, em temperatura ambiente variando de 15 a 30°C e fora do alcance das crianças.**
- Proteger a pele e os olhos, durante o manuseio e aplicação do produto.
- Utilizar equipamentos individuais de proteção tais como: luvas, botas, avental, macacão e outros, durante a manipulação e aplicação do produto.
- Não guardar ou aplicar os brincos junto com alimentos, medicamentos, produtos de higiene, bebidas e utensílios domésticos.
- Descartar as embalagens vazias de forma segura e evitando a contaminação do meio ambiente.
- Produto tóxico para abelhas.
- Após a utilização do produto, remover as roupas protetoras e tomar banho.
- Em caso de intoxicação humana procurar imediatamente assistência médica, levando consigo a embalagem do produto.
- Não comer, beber ou fumar durante a aplicação do produto.
- Trocar os brincos após 180 dias de uso.

GRUPO QUÍMICO DO COMPONENTE ATIVO: Organofosforado.

APRESENTAÇÃO:

20 brincos e 20 pinos acondicionados em sachê plástico.

FABRICANTE E PROPRIETÁRIO:

CLARION BIOCÊNCIAS LTDA.

R.4, S/N, Qd. 07, Lt. 47-55, Polo Empresarial Goiás.

Aparecida de Goiânia/GO.

CNPJ/MF 03.244.722/0004-22.

adm@clarionbio.com.br

www.clarionbio.com.br

TELEFONE: (62) 3611-1600

Resp. Técnico:

Gladstone Santos de Souza, PhD - CRMV/GO nº 1.863.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.758 em 16/12/2003.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE:
CCI: 0800 7713733 - 24 HORAS.


CUIDADO
VENENO

INDÚSTRIA BRASILEIRA

 **CLARION**®