

Para bovinos de corte e leite

Uso Veterinário

Novatack[®]

GOLD

Novaluron 10,0%
Eprinomectina 1,8%

FÓRMULA:

Cada 100mL contém:

Novaluron	10,0g
Eprinomectina	1,8g
Veículo q.s.p.	100,0mL

ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA**BOVINOS:**

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 6 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: CARÊNCIA ZERO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

INDICAÇÕES:

NOVATACK GOLD é um endectocida injetável associado a um inibidor do crescimento de carrapatos, indicado para o controle de parasitas externos e internos dos bovinos, sensíveis aos princípios ativos do produto, tais como: **carrapatos** (*Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus*), **bernes** (*Dermatobia hominis*), **bicheiras** (*Cochliomyia hominivorax*) e **moscas-dos-chifres** (*Haematobia irritans*).

Nematódeos (vermes) gastrintestinais adultos e larvas de 4º estágio: *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Ostertagia ostertagi* e *Cooperia punctata*.

POSOLOGIA:

NOVATACK GOLD apresenta-se pronto para uso. Administrar exclusivamente pela via subcutânea, na dose de 2000µg/Kg de peso vivo de novaluron e 360µg/Kg de peso vivo de eprinomectina, ou seja, 1mL para cada 50Kg de peso vivo. Aplicar sob a pele solta, atrás ou na frente da escápula (paleta), utilizando uma agulha de calibre 18, de 15 a 20mm de comprimento.

Peso Kg	Dose mL	Número de tratamentos por frasco de:		
		200mL	500mL	1L
50	1	200	500	1000
100	2	100	250	500
150	3	66	166	333
200	4	50	125	250
300	6	33	83	166
400	8	25	62	125
500	10	20	50	100

Obs.: Para animais mais pesados seguir a mesma proporção de 1mL para cada 50Kg de peso vivo.

PRECAUÇÕES:

- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Usar equipamento estéril e seguir as normas de assepsia durante o manuseio e aplicação do produto.
- Não fumar ou se alimentar durante o manuseio e aplicação do produto.
- Lavar bem as mãos após o manuseio do produto.
- Não guardar ou aplicar o produto junto com alimentos, medicamentos, produtos de higiene, bebidas e utensílios domésticos.
- Não administrar por via intramuscular ou intravenosa.
- Aplicar somente em bovinos.

SEGURANÇA:

NOVATACK GOLD possui ampla margem de segurança e pode ser administrado em animais jovens, vacas prenhas e em touros na idade reprodutiva. Não foram observadas reações adversas, mesmo quando o produto foi administrado em até três vezes a dose recomendada.

SEGURANÇA AMBIENTAL:

- Não descartar o produto em mananciais de água como rios, lagos e represas.
- Limpar os equipamentos utilizados na aplicação do produto de maneira a evitar contaminação ambiental.
- Recomenda-se descartar as embalagens em aterro industrial ou encaminhar para incineração.
- Produto tóxico para abelhas e peixes.

GRUPO QUÍMICO DOS COMPONENTES ATIVOS:

Benzoilfeniluréia (novaluron) e avermectina (eprinomectina).

APRESENTAÇÕES:

Frascos de polietileno de alta densidade contendo 200mL, 500mL e 1L.

CONSERVAÇÃO:

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local arejado, ao abrigo da luz e calor, em temperatura ambiente variando de 15 a 30°C.

Uma vez aberto e perfurado a rolha, o produto poderá ser utilizado em até 6 (seis) meses.

ATENÇÃO:

Este medicamento não é para uso humano.

FABRICANTE E PROPRIETÁRIO:**CLARION BIOCÊNCIAS LTDA.**

R.4, S/N, Qd. 07, Lt. 47-55, Polo Empresarial Goiás.

Aparecida de Goiânia/GO

CNPJ/MF 03.244.722/0004-22.

E-MAIL: adm@clarionbio.com.br

www.clarionbio.com.br

TELEFONE: (62) 3611-1600

Resp. Técnico: Dr. Gladstone Santos de Souza - CRMV/GO nº 1.863.

Licenciado pelo MAPA desde 15/04/2015.

Registrado sob o nº GO 000005-1.000009.

Nº da partida / Data da fabricação / Data do vencimento:

Vide rótulo do frasco.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

