

Wormek®

USO VETERINÁRIO

Injetável para bovinos

Para tratamento e controle dos parasitos Internos e externos dos bovinos.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Ivermectina	1,0 g
Veículo q.s.p	100,00 mL

INDICAÇÕES:

Wormek® é um endectocida com amplo espectro de ação, sendo eficaz no controle e tratamento das principais parasitoses dos bovinos, incluindo:

- Vermes redondos:

Haemonchus placei (adulto e larvas de 3° e 4° estádios),

Trichostrongylus axei (adulto e larvas de 4° estágio),

T. colubriformis (adulto e larvas de 4° estágio),

Cooperia spp (adulto e larvas de 4° estágio),

C. punctata (adulto e larvas de 4° estágio),

Ostertagia ostertagi (adultos, larvas de 3° e 4° estágio e larvas com o desenvolvimento inibido),

Oesophagostomum radiatum (adultos e larvas de 3° e 4° estágio),

Bunostomum phlebotomum (adulto e larvas de 3° e 4° estágio),

Nematodirus helvetianus (adultos),

Trichuris discolor (adultos),

Strongyloides papillosus (adultos);

- Verme redondo pulmonar:

Dictyocaulus viviparus (adultos);

- Ácaro causador da sarna:

Sarcoptes scabiei var. bovis;

- Berne, larvas de:

Dermatobia hominis.

Wormek® auxilia o controle de:

- **Ácaro:** *Chorioptes bovis*;

- **Bicheira:** larvas de *Cochliomyia hominivorax*;

- **Carrapato:** *Boophilus microplus*.

MODO DE USAR E POSOLOGIA:

Wormek® deve ser aplicado por via subcutânea (injeção sob a pele), de preferência na região anterior ou posterior à escápula (pá). Deve-se evitar aplicar este sobre a pá ou costelas dos bovinos.

Agulhas e seringas, antes do uso, devem ser submetidas ao processo de esterilização normais. O local da aplicação, no animal, deve ser previamente desinfetado com algodão embebido em álcool iodado ou similar.

- Aplicar 1 mL de produto para cada 50 kg de peso (equivalente a 200 µg de

Wormek® por kg de peso), conforme tabela:

Tabela de dosagens em kg	TABELA DE DOSAGENS: Volume (mL)	Ivermectina base (mg)
Até 50 kg	1	10
de 51 a 100 kg	2	20
de 101 a 150 kg	3	30
de 151 a 200 kg	4	40
de 201 a 250 kg	5	50
de 251 a 300 kg	6	60
de 301 a 350 kg	7	70
de 351 a 400 kg	8	80
de 401 a 450 kg	9	90
de 451 a 500 kg	10	100
de 501 a 550 kg	11	110
de 551 a 600 kg	12	120

OBSERVAÇÃO:

Observou-se em alguns casos desconforto passageiro em bovinos após a aplicação subcutânea. Foi observado pequena incidência de edemas dos tecidos moles no local de aplicação. Tais reações desaparecem sem nenhum tratamento.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 35 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA CONSUMO HUMANO

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

PROIBIDO O USO DESTA BULA EM BOVINOS DE CORTE CRIADOS EM REGIME DE CONFINAMENTOS, SEMI-CONFINAMENTOS E EM REGIME EXTENSIVO NA FASE DE TERMINAÇÃO.

RESTRIÇÕES DE USO, PRECAUÇÕES E CONSERVAÇÃO:

Não administrar o produto em vacas leiteiras lactantes em fase de reprodução

O produto não deve ser aplicado por via endovenosa ou intramuscular

Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio;

Lavar as mãos após o manuseio;

Não jogar embalagens vazias nos rios ou lagos.

Produto tóxico para peixes.

CONSERVAR EM LOCAL FRESCO E SECO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

LICENCIADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

SOB Nº 6.579 EM 03/11/98.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DR. PAULO ROBERTO ANDREOLI - CRMV/SP - Nº 8147

APRESENTAÇÃO:

Frasco ampola plástico com 20, 50, 200, 500 mL e 1 litro.

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

Vétoquinol Saúde Animal Ltda

Telefone: (11) 3568-1111

Rodovia Fernão Dias, km 56 - Mairiporã - SP
CNPJ: 60.528.742/0001-16 - Indústria Brasileira

